



## REDULESS® W

**Élesztőtermék a borok kén-hidrogénes, bakszagos, szulfidos, szulfitos íz- és illathibáinak, szaghibáinak kezelésére. Zárt redukív borok illatvilágának megnyitására.**

**TERMÉKLEÍRÁS:** A REDULESS® W egy különleges élesztőtermék, amit a borok szulfidos és szulfitos íz- és szaghibáinak csökkentésére fejlesztettek ki. A REDULESS® W nagy koncentrációban, természetes, sejtekbe beépült szerves kötésű rezet tartalmazó inaktívált élesztő.

### HATÁSA A BORRA:

- Csökkenti a H<sub>2</sub>S (kén-hidrogén), DMS (dimetil-szulfid) és más kénvegyületekhez kötődő illat- és szaghibákat a borban.
- Javítja a bor összbenyomását, komplex minőségét (nagyobb teltségérzet, csökkenti a fenolos anyagok által okozott íz és szaghibákat).
- Különbözik a réz-szulfátos kezeléstől, mivel a bor réztartalmát nem növeli, és nem jelentkezik a réz-szulfátos kezelés spröd karaktert okozó hatása sem.

### ALKALMAZÁS, ADAGOLÁS:

- 20-30 g/hl. Durva böckser estén ismételt kezelés is lehetséges.
- 10 g/hl enyhén zárt borok illatának megnyitására, reaktíválására, felfrissítésére

### TEENDŐK, HA KÉN-HIDROGÉN, BÖCKSER PROBLÉMÁVAL SZEMBESÜLÜNK:

1. Erjedés közben Uvavital adagolással korigálható (lásd Uvavital leírás).
2. Erjedés után:
  - Levegőztetés nélkül a REDULESS® W termékkel aromaveszteség nélkül korigálható a bor. Ez különösen az illatos redukív fehér- és rozé boroknál fontos.
  - **Ha levegőztetni kívánjuk a bort előbb kis tételben (palack, pohár) ellenőrizzük a levegőztetés hatását,** mert a levegőztetés a kénvegyületeket más íz- és szaghatású diszulfidokká oxidálja, és nagymértékű böckser esetén a levegőztetés hatására kialakulhat akár olyan, már rézzel és rézélesztővel nem kezelhető érzékszervi küszöb fölötti diszulfidvegyületek által okozott böckser, aminél egyetlen lehetséges megoldásként marad az aktív szenezés lehetősége! **Ha a próbánál a levegőztetés nem hoz megfelelő eredményt, levegőztetés nélkül a REDULESS® W -t kell először használni!**

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Oldja a REDULESS® W-t 10x-es mennyiségű vízben és keverje el. Adja azonnal a borhoz. Ha előre készítette el az oldatot, keverje fel újra alaposan, mielőtt a borba teszi.
2. A borban alaposan kevertesse el, hogy a megfelelő anyagok találkozzanak egymással.
3. **5-6 nappal a kezelés után fejtsük le a bort az aljról. A REDULESS® W-s derítés után 1 hétig maradhat az aljon a bor,** mert 1,5-2 hét után a REDULESS® W lassan elkezd magából elengedni a rezet. **Tehát a derítés után 5-6 nappal, legkésőbb 1 héten belül fejtsük le a bort, hogy a réz beoldódását elkerüljük! Az üledékről történő alapos elválasztásra különösen figyeljünk oda.**
4. Ha valami ok folytán két hétnél tovább maradt a bor az aljon, a kezelés után végezzünk rézanalízist!
5. A REDULESS® W nem befolyásolja a bor stabilitását, utólagos derítést nem igényel.

**TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG:** Hűvös, száraz, közvetlen napfénytől és erős szagoktól védett helyen a gyártástól számított 4 évig eltartható. Felbontás után gondosan, légmentesen lezárva, száraz, hűvös helyen tovább tárolható, mivel nem tartalmaz élő élesztőt. Ebben az esetben egy éven belül használjuk fel.

**CSOMAGOLÁS:** 2,5 kg-os kiszerelés, társított fóliás csomagolás. 10 kg-os gyűjtőcsomagolás, kartondoboz.

**SPECIFIKÁCIÓ:** Összetétel: inaktívált *Saccharomyces cerevisiae* élesztősejttel termék bentonit ásványi anyag kiegészítéssel. A bentonit szerepe nem a kénvegyületek megkötése, hanem az inaktív szerves kötésben rezet tartalmazó élesztő borból történő kiüleptése.

Megjelenés: bézs színű, élesztő jellegű.

Az itt leírt információk igazak és legjobb tudásunknak megfelelőek. A gyártó garantálja a termékminőséget. Egyedi alkalmazásért, meghatározott kezelés sajátos körülményeiből adódó következményeiért az előállító nem vállal felelőséget!